



๑๑๖๒๕๔๗๕๓๗๖๓



ที่ ขย ๐๐๐๘ / ส ข ข ผ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น
เลขที่ ๖๖๐๙
รับวันที่ ๕ ก.ค. ๖๕
เวลา.....น.

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ถ.องค์การฯ สาย ๑ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน นายกองดี กรมการส่วนตำบลชัยบาดาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	จำนวน	ฉบับ
๑. ร่วมมือกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน	จำนวน	๑ ชุด
๒. ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน	จำนวน	๑ ชุด
๓. การรักษาโรคลัมปี สกิน	จำนวน	๑ ชุด
๔. ข้อเสนอแนะการควบคุมป้องกันแมลงในสัตว์และคอกสัตว์	จำนวน	๑ ฉบับ
๕. สมุนไพรไล่แมลง	จำนวน	๑ ชุด
๖. ข้อควรปฏิบัติเมื่อสัตว์ยังไม่ป่วย	จำนวน	๑ ฉบับ
๗. ข้อควรปฏิบัติกรณีสัตว์ป่วย	จำนวน	๑ ฉบับ
๘. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน	จำนวน	๑ ชุด

ด้วย สถานการณ์โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบการเกิดโรคใน ๑๑๑ ตำบล จาก ๑๕ อำเภอ มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคลัมปี สกิน จำนวน ๙๒๖ ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด ๙,๒๘๐ ตัว พบสัตว์ป่วย ๑,๗๖๗ ตัว และพบสัตว์ตาย จำนวน ๒๙ ตัว นั้น

เพื่อให้การควบคุม ป้องกัน โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR CODE แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรทราบ
โดยทั่วกัน จักขอขอบคุณยิ่ง

- Wohlschlaun

- ลำบากหนักไปสุด
จนกระทั่งขงวิจิตร
อนุเสาวนีย์ไปหา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โปรดเกล้าฯ ให้



สิ่งที่ส่งมาด้วย

- Wilson's disease

Q. 5. Agaricus mouth
of hermit down

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๒๓๓๔ ต่อ ๑๑

www.dld.go.th/pvlo_cpm/

(นิรุจน์ เกลียวขาว)

หัวหน้าสำเนาปลัด อบต. หนอง...

ขอแสดงความนับถือ

W. W.

(นางศรีสมัย โชติวนิช)
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

1991

(ชัยชุมพล) ทองแย้ม

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

Om

[illegible]

๒๒๖. การบริหารสวนตำบล

ร่วมมือกัน

หยุดการแพร่ระบาด

“โรคล้มปี่ สกีน”

ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคโดย

1. งดการเคลื่อนย้ายสัตว์
เพื่อลดการแพร่กระจายโรค



2. ควบคุมกำจัดแมลงดูดเลือด
เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อในฟาร์ม



กางมุ้ง ตัดไม้ไล่แมลง

พ่นคอก/พ่นโค

3. ห้ามบุคคลภายนอก เข้า – ออกฟาร์ม
(หากจำเป็นต้องอาบน้ำ เปลี่ยนชุดก่อนเข้าฟาร์ม)

4. ห้ามใช้เครื่องมือร่วมกันโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะเข็ม และไซริงค์ฉีดยา



5. งดผสมเทียม
(ทั้งการใช้พ่อพันธุ์หรือผสมเทียม)



จัดทำโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กรมปศุสัตว์

โทร. 044-812334 ต่อ 13 , 044-811928

✉ pvlo_cpm@dld.go.th





โรคคัมปี สกิน

Lumpy skin disease : LSD



เกิดจากเชื้อไวรัส ระบาดในโค - กระบือ
“ไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน”

ลักษณะอาการ

- ใช้สูง ชุ่ม เปื่ออาหาร ชุบผอม มีน้ำมูก น้ำตา เยื่อตาขาว หรือกระจกตาอักเสบ
- มีตุ่มขึ้นบริเวณทั่วลำตัว ต่อมาน้ำเหลืองใต้ผิวหนังบวม ลักษณะคล้ายฝี ปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นเนื้อตาย สะเก็ดแห้งแข็ง และแผลเป็น บางตัวขาบวม
- แม่โคอาจเกิดการแท้ง ในโคนมนลดลงอย่างชัดเจน

ลักษณะคล้ายฝี ปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นเนื้อตาย



ใช้สูง ชุ่ม เปื่ออาหาร ชุบผอม



มีตุ่มขึ้นบริเวณทั่วลำตัว



กระจกตาอักเสบ



ต่อมน้ำเหลืองใต้ผิวหนังบวม

การติดต่อ

- ผ่านทางแมลงดูดเลือด ได้แก่ ยุง แมลงวันดูดเลือด เหลือบ เห็บ
- ผ่านทางสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ป่วย ได้แก่ น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย เลือด รวมทั้งน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่ติดเชื้อได้
- เชื้อไวรัสสามารถติดต่อสู่ลูกผ่านทางรกได้
- ผ่านคนที่ปนเปื้อนเชื้อ
- ผ่านเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน เช่น เข็ม ไชริงค์ฉีดยา



เชื้อเมือกต่างๆ

เข็มใช้ซ้ำ

หากพบในฟาร์มควรทำอย่างไร

- แยกสัตว์แสดงอาการออก เพื่อรักษาและป้องกันการระบาดเพิ่ม
- กำจัดพาหะแมลงดูดเลือดโดยใช้ สารกำจัดแมลงละลายน้ำ หรือสมุนไพร พ่นบริเวณตัวสัตว์และบริเวณคอกในฟาร์ม เช่น อะมิทราซ(Amitraz) ไชเปอร์เมทริน หรือเคลตาเมทริน เป็นต้น พ่นคอกสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง , พ่นบนตัวสัตว์ (ยกเว้นหน้า) วันละ 1 - 2 ครั้ง
- เผื่อระวังติดตามอาการในสัตว์ที่ไม่แสดงอาการ



ตัวอย่างสารกำจัดแมลง (ไม่ตกค้างในฟาร์ม)

แนวทางการรักษาเบื้องต้น

- ยากลุ่มลดไข้ ลดอักเสบ ลดบวม เช่น Flunixin meglumine , Tolfenamic acid , หรือ Dexamethasone (ในโคไม่ท้อง) เป็นต้น
- ยาปฏิชีวนะ เช่น Oxytetracycline , Penicillin , Cephalosporins
- ยากลุ่มอื่นๆ เช่น ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ หรือให้สารน้ำ เป็นต้น
- ทั้งนี้การรักษาขึ้นกับระดับอาการที่พบ แล้วแต่กรณี และควรปรึกษาสัตวแพทย์

หากพบให้รีบแจ้ง
ปศุสัตว์ในพื้นที่
เพื่อควบคุมการระบาด



<http://pvlo-cpm.dld.go.th/indexnew.html>



อาการของโรคลัมปี สกิน



ระยะที่ 1

ระยะมีไข้ เป็นระยะที่โค กระบือ มีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร อาจมีน้ำตา และน้ำมูกในลูกสัตว์ โดยมักจะพบใน ระยะ 1-2 วันแรก ก่อนแสดงอาการ หรือพร้อมกับระยะมีตุ่มได้ผิวหนัง

ระยะที่ 2

ระยะมีตุ่มได้ผิวหนัง เป็นระยะที่โค กระบือ มีตุ่มน้ำเหลืองได้ผิวหนังตาม มีตุ่มบนได้ผิวหนัง อีกขณะคล้ายมี หรือเป็นผื่นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะไม่มีหัวและแข็ง



ระยะที่ 3

ระยะที่ตุ่มได้ผิวหนังแตก เป็นระยะที่ตุ่ม หรือผื่นแตก ซึ่งจะค่อยๆ มีน้ำเหลืองซึม จากตุ่ม จนมีสะเก็ดเป็นๆ หนา และแตก เป็นแผลหลุม มีขอบนูนสูงขึ้น ซึ่งระยะเวลา การแตกของตุ่มได้ผิวหนังจะไม่พร้อมกัน



ระยะที่ 4

ระยะแผลเริ่มหาย เป็นระยะที่แผลเริ่ม มีการหาย วงแผลแคบจนปิดสนิท และอาจมีสีเปลี่ยนในช่วงแรก



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่



044-812334 ต่อ 13 , 044-811928



pvlo_cpm@dld.go.th



<http://pvlo-cpm.dld.go.th/>



การรักษาโรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส จึงไม่มียารักษาเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง แต่จะเป็นการรักษาตามอาการ และการบำรุงร่างกายให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง

แนวทางการรักษาเบื้องต้น



ยาลดไข้ ลดการอักเสบ



ชื่อยา: พาราเซตามอล



ชื่อยา: ไบรอฟเอน



ชื่อยา: พริโดนิสัน เมทิลิน

ยาปฏิชีวนะ เลือกชนิดที่ออกฤทธิ์กว้าง ใช้รักษาการติดเชื้อแทรกซ้อน



ชื่อยา: เพนนิซิลิน



ชื่อยา: คลินดามัยซิน



ชื่อยา: คลอไตรมazole



ชื่อยา: แอม็อกซิซิล

วิตามิน
ใช้บำรุงร่างกาย
หลังฟื้นไข้



ชื่อยา: วิตามินดี 3 ที



ชื่อยา: แคลเซียม



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

☎ 044-812334 ต่อ 13 , 044-811928



prvo_cpm@dld.go.th



<http://prvo-cpm.dld.go.th/>



การรักษาลูกโค

กรณีป่วยด้วยโรคล้มปี่ สกีน

ลูกโคที่ติดเชื้อไวรัสล้มปี่ สกีน มักมีอัตราการป่วยและอัตราการตายที่สูง สาเหตุที่ทำให้ลูกสัตว์เสียชีวิตได้ง่าย เนื่องจากภาวะไข้สูง, มีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ระบบทางเดินหายใจ, ดูละกอนไม่ได้ เนื่องจากอาการโรคมอง

แนวทางการรักษามีดังนี้

1. จัดยาปฏิชีวนะ กลุ่ม เพนนิซิลิน, อ็อกซี, อะม็อกซิ, เซฟา
 2. จัดยาลดไข้ เช่น ไบวาซีแลน, เพนโทยาน
 3. ให้สารน้ำและสารอาหารทางเส้นเลือด
 4. เช็ดตัวลูกโค ด้วยผ้าชุบน้ำเย็น
- ในช่วงที่มีไข้สูง

5. กรองน้ำให้กับลูกโคกินดื่มที่



การป้องกันไม่ให้ลูกโคป่วย
ทำได้โดย กางมุ้ง/ติดหลอดไฟ
ป้องกันแมลง และพ่นยากำจัด
แมลงภายในคอก เป็นประจำ





**ข้อเสนอแนะการควบคุมป้องกันแมลง
ในสัตว์และคอกสัตว์**

นันทสัตว์และคอกสัตว์ ใช้สารเคมีหรือสมุนไพร

1

ใช้เทนอร์เมทรีน ผสมน้ำ 1:400 น่นที่คอกสัตว์ให้ดื่ม
และใส่ปือกก็ฉีดน่นแถวลำตัว อย่างนั้นใส่หน้า จมูก
หรือตาสัตว์ ถ้าจำเป็นใช้น้ำขบ่นาขนาดๆ เช็ดที่แก้ว หรือ

2

ใช้น้ำส้มควนไม้ ผสมน้ำนํ้าที่ตัวสัตว์

1479

3

ใช้ใบยูลาดึงสัตว์ ใบน้อยหน้า ใบสะเคา ใบตะโครับหอม
ต้มรวมกัน แล้วใ้ใช้น้ำนึ่งที่ตัวสัตว์ และคอกสัตว์ทุกวัน หรือ

4

ใช้ใบแห้งต้มน้ำจิบ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
และคอกสัตว์

ไม่แนะนำให้ใช้ "ยาฆ่าหญ้า" นันทคอกสัตว์
และบนตัวสัตว์ เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
ระคายเคืองมาก อาจทำให้สัตว์ป่วยรุนแรงขึ้น



สมุนไพรพื้นบ้าน ไล่แมลง



วัตถุดิบ

1. ใบยูคา
2. ตะไคร้หอม
3. ใบน้อยหน่า
4. ใบสะเดา



วิธีทำ



นำวัตถุดิบทั้งหมดต้มรวมกัน ทิ้งไว้ให้เย็น
แล้วนำมาพ่นภายในคอกสัตว์ และบริเวณ
รอบๆ คอกสัตว์เลี้ยง หรือพ่น/ทาบนตัวสัตว์



วัตถุดิบแต่ละชนิด
ไม่กำหนดปริมาณ
ต้มรวมกันได้ตามวัตถุดิบที่มี

สามารถฉีดพ่นได้ทุกวัน
ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์





สูตรยาฉุน ไล่แมลง

ส่วนผสม

1. ยาฉุน 1 กิโลกรัม
(หรือหากใช้น้อยก็ลดอัตราส่วนผสมมา)
2. น้ำสะอาด 15 ลิตร

วิธีทำ

แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หรือต้มน้ำให้เดือด
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น เมื่อทำเป็นหัวเชื้อ
ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 15 ลิตร
นำมาฉีดพ่นภายในคอกสัตว์
และบริเวณรอบๆ คอกสัตว์เลี้ยง
หรือผ่าน/ทาบนตัวสัตว์





น้ำส้มควนไม้



ประโยชน์
น้ำส้มควนไม้
ใช้ด้านศัตรูสัตว์/
สัตว์เลี้ยง



ช่วยลดและดับกลิ่น, ขับไล่แมลงในคอกสัตว์ โดยผสมน้ำฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง

อัตราการใช้ : น้ำส้มควนไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 100 ส่วน หรือ

น้ำส้มควนไม้ 1 ผา (ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ

น้ำส้มควนไม้ 20 ผา (ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร



ใช้กำจัดเห็บ หมัด และโรคเรื้อรังของสัตว์ โดยใช้ฉีด ทาบริเวณผิวหนังสัตว์
ตรงบริเวณที่เห็บ หมัด สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

อัตราการใช้ : ใช้น้ำส้มควนไม้แบบเข้มข้น (ไม่ต้องผสมน้ำ)

ใช้ป้องกันเห็บ หมัด และโรคเรื้อรังของสัตว์ ขับไล่แมลงรบกวน

โดยผสมน้ำ และใช้ผ้าชุบเช็ดตัวสัตว์ สัปดาห์ละครั้ง

อัตราการใช้ : น้ำส้มควนไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 100 ส่วน หรือ

น้ำส้มควนไม้ 1 ผา (ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ

น้ำส้มควนไม้ 20 ผา (ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร





โรคลัมปี สกิน

ข้อควรปฏิบัติ

เมื่อสัตว์ยังไม่ป่วย

นายวิเชียร จิตกรโมลสิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายสราวุธ ชานันต์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

1

งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ และงดบุคคลภายนอก
เข้า - ออกฟาร์ม ภายในช่วงมีการระบาดของโรค

2

ทำความสะอาดคอกสัตว์ และเก็บมูลสัตว์ทุกวัน

3

ฉีดหรือกรอกยา กำจัดพยาธิภายนอก - พยาธิ
ภายใน ให้กับสัตว์เป็นประจำ เพื่อให้สัตว์แข็งแรง

4

ป้องกันแมลงดูดเลือด โดยกางมุ้ง หรือ ติดไฟไล่แมลง
ฉีดพ่นกำจัดแมลงภายในคอกเป็นประจำ โดยใช้สารเคมี
หรือ สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ใบสะเดา , ใบยูคาลิปตัส ,
ยาฉุน , น้ำส้มควันไม้ เป็นต้น

5

ห้ามใช้เครื่องมือร่วมกันโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเข็ม
และโซริงค์ฉีดยา

6

งดผสมพันธุ์สัตว์
(ทั้งใช้พ่อพันธุ์หรือผสมเทียม)



จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-812334 ต่อ 13 , 044-811928

อีเมล: pvldo_cpm@vld.go.th





นายวิเชียร ปิ่นทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุวิทย์ ช่างใบ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

- 1 แจกปุ๋ยสัตว์อำเภอในพื้นที่
- 2 ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า - ออกฟาร์ม และ
งดให้บุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม
ในช่วงที่มีการระบาดของโรค
- 3 แยกสัตว์ป่วย เพื่อรักษาตามอาการของโรค
- 4 ห้ามใช้เครื่องมือร่วมกันโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะเข็ม และไซริงค์ฉีดยา
- 5 พ่นยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลง เพื่อควบคุม
ป้องกันกำจัดแมลงไปพร้อมกัน ป้องกันการ
แพร่ระบาด มีละอองเชื้อจะแพร่ระบาดไปยัง
สัตว์ตัวอื่น และฟาร์มอื่น
- 6 งดผสมพันธุ์สัตว์
(ทั้งการใช้พ่อพันธุ์ หรือผสมเทียม)



จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์
โทร 044-812334 ต่อ 13 , 044-811925
pvtlo_cpnm@dld.go.th





คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ วัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน



1. ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าวัคซีนที่กรมปศุสัตว์สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ จะตรงกับเชื้อที่ระบาดในประเทศไทย

ตอบ : กรมปศุสัตว์ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อที่ระบาดในพื้นที่กับเชื้อที่ผลิตวัคซีนมีความใกล้เคียงกัน

2. ถาม : สัตว์กลุ่มไหนที่จะฉีดวัคซีนได้

ตอบ : - ฉีดในสัตว์ที่สุขภาพแข็งแรงเท่านั้น และไม่อยู่ในฝูงที่มีสัตว์ป่วย

- ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้เริ่มฉีดที่อายุ 6 เดือน (ตามเอกสารแนะนำของวัคซีน) ทั้งนี้จะมีการประเมินระดับภูมิคุ้มกันของแม่เพื่อให้ลูกเพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ในการเริ่มฉีดวัคซีน ลูกสัตว์ในประเทศไทยต่อไป

- ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ไม่เคยฉีดวัคซีน อาจเริ่มฉีดวัคซีนได้ทุกช่วงอายุ เมื่อลูกสัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย (ตามเอกสารแนะนำของวัคซีน)

3. ถาม : พื้นที่ที่กำหนดให้ใช้วัคซีน คือที่ไหนบ้าง

ตอบ : พื้นที่รัศมีรอบจุดเกิดโรคจากการระบาดนอกของวงรัศมีการเกิดโรค ร่วมกับการจัดการเคลื่อนย้ายและควบคุมกำจัดแมลงพาหะ โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชืสูง เช่น พื้นที่ที่มีการเลี้ยงโค กระบือหนาแน่น และเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกมาก

4. ถาม : การเก็บรักษาวัคซีนต้องทำอย่างไร

ตอบ : เก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็น ฤทธิ์อ่อน หากดูแลไม่ดีอาจทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ หรืออาจจะไม่สามารถกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เพียงพอตามที่ต้องการ



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ



044-812334 ต่อ 13 , 044-811298



คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ วัคซีนป้องกันโรคคúmปี สกีน



5. ถาม : ภายหลังจากการฉีดวัคซีน สัตว์จะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันกี่วันจึงจะป้องกันโรคได้

ตอบ : ประมาณ 3 สัปดาห์ ดังนั้นในช่วงที่สัตว์ยังไม่มีภูมิคุ้มกันจึงจำเป็นต้องป้องกันสัตว์ติดเชื้อโดยใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การกางมุ้ง การใช้อาพ่าแมลง และสมุนไพรไล่แมลง

6. ถาม : ฟาร์มที่กำลังเกิดโรคจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่

ตอบ : ไม่ควรฉีด เนื่องจากหากสัตว์ติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้สัตว์แสดงอาการป่วยภายหลังจากการฉีดได้ นอกจากนี้หากมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของเชื้อ จากวัคซีนกับเชื้อในพื้นที่ อาจจะส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสได้

7. ถาม : สัตว์ที่หายป่วยแล้วจะต้องฉีดวัคซีนหรือไม่

ตอบ : ยังไม่จำเป็นต้องฉีด เนื่องจากสัตว์ที่หายป่วยแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคที่ป้องกันได้เป็นระยะเวลานานกว่า 150 วัน (5 เดือน)

8. ถาม : ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 แล้วต้องฉีดวัคซีนอีกบ่อยแค่ไหน

ตอบ : ตามเอกสารแนะนำของวัคซีนให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง แต่จะประเมินตามสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่อีกครั้ง

9. ถาม : หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ต้องมีวิธีการหลักปฏิบัติอย่างไร

- ตอบ :
- งดนำสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อนำเนื้อไปบริโภคเป็นระยะเวลา 21 วัน
 - งดเคลื่อนย้ายออกจากฟาร์มเป็นระยะเวลา 1 เดือน
 - ป้องกันและลดแมลงพาหะ (แมลงดูดเลือด) ในฟาร์มโดยการกางมุ้ง การใช้อาพ่าแมลง หรือสมุนไพรไล่แมลง





คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ วัคซีนป้องกันโรคล้มปี่ สกิน



10. ถาม : หลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

ตอบ : อาจทำให้มีไข้ เป็นตุ่มบวมที่ผิวหนัง คอมน้ำเหลืองบวม มีน้ำมูก น้ำตาไหล และในโคนมอาจทำให้มีน้ำนมลดได้

11. ถาม : ประเทศไทยมีนโยบายที่จะนำเข้าวัคซีนมาควบคุมโรคหรือไม่

ตอบ : กรมปศุสัตว์ได้อนุญาตให้นำเข้าวัคซีนมาควบคุมโรค เป็นกรณีพิเศษ เกษตรกรที่สนใจจะจองวัคซีนให้ลงชื่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้องที่ ทุกแห่ง เมื่อได้รับทราบว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนแล้ว จึงจะรวบรวมเงิน ค่าวัคซีนต่อไป



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ



044-812334 ต่อ 13 , 044-811298



โรคล้มปี่ สกีน

ไม่ติดต่อสุคน

รักษาได้และหายขาด

เนื้อปลอดภัย บริโภคได้

